

Estudo

NOVA

*Norepinephrine and vasopressin for rescue versus
early Vasopressin for vasopressor dependent
sepsis*

NoVa Trial

Paciente com infecção suspeita ou confirmada e uso de noradrenalina?

Avalie a inclusão no ESTUDO NoVa



Critérios de inclusão

- Pacientes adultos (≥ 18 anos)
- Internados em unidades de terapia intensiva ou com previsão de admissão em UTI nas próximas 12 horas
- Ressuscitação volêmica adequada na opinião da equipe assistente
- Sepses dependente de vasopressores
- Uso de noradrenalina $> 0.05\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$ e $\leq 0.25\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$ por ao menos 1 hora e no máximo 24 horas no momento da inclusão



Critérios de exclusão

- Uso de noradrenalina $> 0.25\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$ nas últimas 24 horas
- Doença renal crônica dialítica ou lesão renal aguda que receberam terapia substitutiva renal na internação ou são esperados receber terapia substitutiva renal (TSR) nas próximas 24 horas
- Uso de outros vasopressores que não noradrenalina no momento da inclusão
- Uso de vasopressores para sepse nos últimos 7 dias
- Isquemia mesentérica aguda suspeita ou confirmada
- Anafilaxia ou hipersensibilidade conhecida a droga do estudo
- Perspectiva de óbito em menos de 24 horas
- Equipe médica não comprometida a investimento pleno no momento da inclusão
- Inclusão prévia no estudo

Se inclusão ou dúvidas, entrar em contato com: