



Paciente randomizado para o Grupo Vasopressina PRECOCE?

**E AGORA?**



**ATENÇÃO**



- TEMOS QUE **REDUZIR O TEMPO** entre randomização e o início da vasopressina
- Tempo deve ser **MENOR** que 2h
- Após randomizar, garanta que a medicação do estudo **seja prescrita** o mais **rápido possível**
- Informe a enfermagem sobre a prescrição, grupo de inclusão e necessidade **imediate** de **preparo e início** da solução

**ATENÇÃO COM A TITULAÇÃO INICIAL DA VASOPRESSINA!  
NA FASE DE TITULAÇÃO OS OBJETIVOS SÃO:**

- Aumento da VASOPRESSINA até a dose máxima (12ml/h). O desmame de NORADRENALINA deve ser feito se PAm  $\geq$  ALVO (ex: 65mmHg) junto com o aumento da dose de VASOPRESSINA.
- SE NORADRENALINA foi desligada, a VASOPRESSINA pode ser usada para atingir a PAm alvo em qualquer uma das doses: 3, 6, 9 ou 12ml/h.
- Se a VASOPRESSINA já em dose máxima (12ml/h), mantenha a infusão nessa dose e ajuste a NORADRENALINA conforme necessário para atingir a PAm alvo

## GRUPO VASOPRESSINA PRECOCE

